



### Consideraciones Generales

- ✿ Para juntar la muestra usted necesita un frasco estéril comprado en la farmacia y un jabón nuevo.
- ✿ Es preferible que 48 hs antes de la recolección no ingiera:
  - a- Antibióticos (salvo indicación de su medico)
  - b- Aspirinas
  - c- Vitamina "C"
- ✿ La muestra se recolectará al acecho

### Procedimiento

- ✿ El adulto que ayudará en la recolección de la muestra debe lavar y secar sus manos cuidadosamente antes de comenzar.

### SexoFemenino

- ✿ Higienizar los genitales externos de la niña, con agua y jabón nuevo, separando los labios mayores. Enjuagar bien.

### SexoMasculino

- ✿ Higienizar los genitales con agua y jabón, retrayendo el prepucio. Enjuagar bien.
- ✿ Una vez que realizó la higiene de la zona genital coloque al niño en una posición cómoda que le permita a usted observar cuando comienza a orinar. Tenga disponible el frasco estéril.
- ✿ Cuando empiece a orinar destape el frasco, dejando escapar las primeras gotas de orina.
- ✿ Coloque el frasco interceptando el chorro y junte la orina restante.
- ✿ Tape el frasco.

Remitir la muestra inmediatamente al laboratorio.

Para el traslado: colocar el frasco en un recipiente con hielo (especialmente los días cálidos)

Fuera del horario de atención se podrá conservar la muestra en la heladera (no congelar), como máximo 24 hs.

**Importante: Bajo Ningún concepto se aceptaran muestras remitidas en bolsas colectoras**

El procedimiento puede llevar un tiempo considerable ya que sus expectativas pueden hacer que el bebe retenga la orina. Es conveniente darle al niño algún líquido (leche, caldo, agua) para estimular la micción.

Por favor completar el siguiente formulario:

---

Nombre y Apellido

---

Hora en que recolectó la muestra

---

Detallar la medicación recibida durante los últimos 4 días

---